

能而欲吐。應服瀉劑。而亦忌。
此經治法最難。故宜小心診察。辨明虛實。雖不敢謂矣。
治法
如實者宜咸心下黃滿。虛者。宜香薷解瀉。如腹脹。
心滿不食或心中懊憹。小便黃赤者。宜常歸白朮湯。
（即白朮茯苓甘草商陸甘草半夏杏仁枳實前胡生薑）。如
大便秘者。改用茵陳蒿湯。如腹成腹脹。漸至身俱黃
服者。急宜梔子蘆薈茯苓丸。（即梔子甘草半夏陳皮木
香麥芽生薑大棗等為丸）飯湯送服。然酒疸之病。如不
早圖治。日久月深。血中之毒實。隨毒氣以變黑色。為
黑疸病。治法尤難。宜梔子大黃湯。合犀角地黃湯。解
血中毒質。甚者可加桃仁川山甲。入血分解毒。散瘀為妙

本報特聘
徐元誥 大律師 爲常年法律顧問
羅家衡 大律師 爲常年法律顧問

粒隱於膚內。不得外出。乃由火毒鬱壅。肌膚爲熱所煎灼。血液受火毒之焦灼。皮膚閉塞。故火毒不得外洩。此候如不用大劑涼下。通其腑氣。解其肌熱。則未有不致死者。治法如下。

生石膏四兩。烏犀角一錢。(磨沖)。羚羊尖六分。(磨沖)。鮮生地一兩。鮮石斛一兩。上川連二錢。生黃芩三錢。生梔子五錢。生大黃三錢。(無食積。若不黃積者。減量。用一錢或二錢)。銀花一兩。連翹五錢。活水風草五兩。(熬水煎藥)。鮮竹葉三十片。(爲引)。

此方服後。則必大瀉。所謂之裏。有如熱實惡臭稠臭。一瀉之後。則高熱必退。肌膚不爲熱毒所灼。涼清而面自覺。以後再減大黃服服一二劑。其他各藥分量。至二三服可以酌減。惟生石膏。必至九劑後再減。防其熱勢復發。否則不救矣。而生石膏必須用生者。熟者不獨無用。反致誤事。切記。

(一) 身必癢 (二) 天麻

(三) 朱丹溪 (四) 甘草

猜中者已將贈品發出矣

(二) 種痘之歷史

種痘之法。始於宋朝。取痘兒之漿。收入棉花。納於鼻孔。男左女右。若不得膿。或以痘痂。或以痘兒新發之漿。與他兒服之。蓋當時人民。見已種者。不獨得痘較輕。且能免天痘之危險。是以兒生數月。或數年。即依法種痘。我國創於前。印度繼於後。迨西歷一千七百二十一年。英國安士孟脫卡 Wark 及 Morda 始傳此法於其國。在都市流行。然種後發症甚重。與天痘無異。甚則有生命之虞。如幸而痊愈。而面部已瘡痕滿點。不復如昔時之潤澤如玉矣。

衛生社會未發開時。人民因痘症傳染神速。致怕及人。故即不知種者。亦莫不往墓。社會上顯為重要之問題。後有人見牛之乳。往往發生瘡疥。漸漸發大。且生膿結痂。與人痘無異。擠牛乳者。偶染其毒。亦皆伴同瘡之痘。後即過天痘。亦無傳染之患。有二教員。名好爾可與爾來脫者。Hornum 曾於一千七百九十九年。取牛痘漿。為三兒種之。預防天痘傳染。至一千七百九十八年愛德氏 Edward 種二十歲之經歷。種牛痘法。始通行。推行各國。種後發症輕微。從無危及生命者。與古時種痘之法相較。甘願不

可以道里計矣。

(未完)

甲	特	二元	時間	診月
乙	門	診一元	門診	上海
丙	出	診四元	費	南
丁	齊	丸方四元	藥	路
戊	金	針	至	第
己	成	針	下午	一
庚	針	隨到	四時止	第
辛	針	隨到	一齊	三
壬	針	隨到	一齊	三
癸	針	隨到	一齊	三

弘儀署

實驗得來之調服良方
 酒疸之研究 (楊舒榮)
 小兒痘毒重灼熱不起治
 驗記 (余恩)
 百病指南 (張治河)
 軍醫生活記 (余不平)
 頑疽指南 (吳爲珍)
 因風方 (郭志遠)
 消汗方 (前人)
 簡易消汗法 (前人)
 婦女經閉成癆方 (前人)
 藥未末
 新水毒方 (前人)

介紹新書
 富士藥劑社近現代名醫醫
 案第一集。現已出版。內容
 甚多豐富。不同一般。亦不
 得毋大洋一角。本館均有代
 售。

■實驗得來之腫脹良方（楊舒棠）

○溶疔方 (前人)
 (無論如何危險均能奏效)
 杜字磨香三厘。上雄黃三厘。
 老式冰片二分。硃中白五分。
 共研細末。用棉絮包藥。塞于
 鼻孔。男左女右。另服太乙靈
 金錠二錢。愈頭湯送下。有百
 發百中之功。

不數月伊聰敏肥碩之甚乎。又奪之去。悲痛哀傷。殆不欲生。經親族婉解。扶養幼子。希僅一脈。葬諸子。勉許存活。廣服伊族中之冠帶。不言以報。繇是病軀漸瘳。不憚孤寡。嚮後無休。良可哀也。姑則頭眩腰痛。嘔吐泛嘔。是爲木鬱土土俗名肝氣）輒起飯盒。屢發爲疾。由靜而動。凝至附風腰脹。相繼而起。雖經醫藥。病勢無減。眼滿及脫。屢延遠診。遲遲延診殆遍。或謂病由情志中來。投以逍遙散越鞠丸等。或謂脾受肝侮。土潰水溢。投以五皮飲理氣統合四君等。舒肝之響。扶脾之困。理氣導水。餘如丹麥小溫中丸。禹餘糧丸。及金匱五苓散。已概棄其方。厚棧七物湯等。治兩眼脹。治氣滯治水。膏盡苦水。毫無效果。藥儲兼施。結伴經年。沉痾漸熾。生機幾絕。後經沈醫投一用體爲（俗名黑魚）一尾（重約八兩）不去鱗。以竹刀削去腥羶。納砂仁末一兩。線紮緊。外塗淳麪之泥。（泥取自田中）約寸許厚。置炭火中。煨至泥變黃色。

途健婦指痛疾婦解
徑康女導苦病女決

治各內本
法種有書

不久血肝也實必節

治痢服氣本服治
 治驚心自美治三
 病救效極容可症
 法法法法法法法
 產產通隔隔
 門後產產產產
 退法催神產產胎
 勝效生效免知孕
 法法法法法法法
 產產立立輕輕
 後孕下閉血水經
 效調便經通辨生
 法法法法法法法
 胎胎盤偏偏坐側
 廢調調包包育產
 生生生生生生生
 療治治治治治治
 法法法法法法法
 四四大賦特厚一洋全
 角收收價價大裝書
 發發發發發發發

(余不平)

第三回 射河濱涕別知己友
火車站贈卹外交家

那送往迎來的輪船，載了我這風流命的傷心人，飄流去了。於是向大家故作鎮靜，點了一點香，憑身鑽入艙中去。剛剛坐下，茶房送來一盞流清茶來，倒了一杯，送到我面前。我便吃了一口茶，好像把銀在我喉嚨中的怨氣，沖下了去。覺得好了許多。隨後又飲了幾口，自己心中暗想道：「眼淚是人體中的一種特種的水分。今天消了這許多眼淚，吃了這幾口茶，能不能把剛才流去的水分，補償起來呢？假使能補償起來，那麼我的身體，還不至於受損。否則我的身體，不是就要壞了嗎？」這樣的想了一陣。

會把流去的眼淚，補償起來呢？你是一個醫生，為什麼連生理作用，都不明白呢？男子漢大丈夫的眼淚，一滴之微，有千金的價值。你為什麼那牠面去了？你不與你環境去奮鬥，倒學上一般婦人女子的態度。你這重天這地男子漢的招牌，不是空掛了嗎？」我想到這裏，如雷震響。如聞喝棒，心地頓覺明白。再要好處一思想道：「一個人有困難的問題，總會有解決的一天。天下無不解決的問題，只要我立定主張，把革命奮鬥的精神拿出來，矢志去求解決，總該有解決的一天。」想到這裏。

(未完)

(張治河)

膈指痛 水分消失。毛細血管乾枯也。
聲音嘶啞 亦水分消失。聲帶無潤澤之故也。
也。
筋抽搐 肌肉痙攣。則筋節抽痛。
厥伏厥冷 水分消失過多。血液濃厚。血
行障礙。故脈搏停止。始而股冷。繼而全
體厥冷。
(治法) 方書對於本症治法。大要分爲熱症寒症
。患者吐瀉之物。腥臭異惡。目現紅絲。唇
焦舌赤。生理發生左血變化者。(即古人所
所說霍亂)宜用左白虎行藥石瀉等湯
。抑制熱熾。清利腸胃。如吐瀉之物。澄

散治。白睛發青。唇舌色白。生理發生貧血變化者。(即古人所說之寒氣亂)宜用理中四逆位脈治。香飲吐不瀉之乾嘔症。則先宜引吐胃中之邪。吐後再予香砂平胃。藿香正氣等方。補助消化工作。

(調導) 充血變化之患者。宜食瓜果清涼之品。貧血變化之患者。宜食麥飯韭蒜辣味健胃之品。本症調攝。與中暑略同。(未完)

□代鄉 治河先生台鑒。 大稿現已告竣。見示請速將稿寄下。爲盼。(編者)

本兩集由第一年春季編起全年材料裝訂而成每集共一百頁計三十
冊由全國數百位名醫選述內容所載完全切合實用無論內外婦幼各
科等症以及一切急難自療方法莫不靡有遺此一書小病能自行
治療大病免藥石亂投稱之爲「康健保障」謹曰不宜每集售價大
一元存書無多欲購從速

總發行所上海三馬路美南路口幸福報館

行乃外科迅速之症。朝發午死。午發暮死。往處鄉間。離鎮路遠。不及延醫而斃命者。多矣。

昔年家祖在姑蘇經商。得友傳簡便清行法。相傳已四拾餘年。救活則不下千計。靈驗異常。

竈竈不拘以數炒炭用葱煎湯送下蓋按出件即消。

按此龜狀如九香虫鄉間竈上均有覓之甚易。

。燥裂開圻爲度。去泥(其角之鱗與皮剝去)及砂仁。食魚肉。
(須淡食切忌鹽醬)壹四九。其病漸瘳。得慶更生。
醫學幼雅如余。於斯零珠異案所解。前當治肝脾。治水治氣。
治本治標。或肝脾水氣根本兼治。何嘗有悖。竟無効驗。至沈
聲單方。亦不外治水氣。(醫心鏡體氣和冬瓜煮白朮藥治十種
水氣)祇四服。沉疴霍然而愈。厥因前諸法。不若單方專純而
近功乎。咸藥味苦而徒傷胃氣。不若單方鮮香而爲胃喜乎。藥
結何在。惟其研究價值。幸明達先進者。有以教我來。

□酒疸之研究

(李健國)

原因 由飢時飲酒。或大醉後當風而臥。入水浸浴。致酒濕之
毒。聞入皮膚。旋入靜脈管。腰輪爲風水所退。不得宜

(李健頤)

婦女經閉成勞方
(秦伯未)
血道壅塞。周身壅滯。不亟治
。則成勞。四蟲丸主之。虛癰
。羸弱者慎服。烏蟲。蠹蟲。水蛭

發。蒸製日久。血中即變一種黃水。滲於肌膚之微細血管。即爲癩瘡。

金匱黃疸病脈篇云。「酒黃疸者。或無熱澀語。小腹滿。欲吐。鼻燥。其脈浮者。先吐之。沉弦者。先下之。」按酒黃疸之症狀。或見如腫水狀。心下俱脹而熱。不